

PROCESSO SELETIVO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS
GABARITO - ENFERMAGEM

Questão	Disciplina	Nível	Pergunta	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Alternativa D	Alternativa Correta
1	Enfermagem	Superior	São vacinas a serem aplicadas até o sexto mês de idade, EXCETO:	febre amarela e tríplice viral.	pentavalente e gripe.	hepatite B e BCG.	rotavírus e meningocócica C.	A
2	Enfermagem	Superior	"Escolhi os plantões, porque sei que o escuro da noite amedronta os enfermos. Escolhi estar presente na dor porque já estive perto de muito sofrimento. Escolhi servir ao próximo porque sei que todos nós um dia precisamos de ajuda. Escolhi o branco porque quero transmitir paz". Essa frase é atribuída a	Edith Magalhães Fraenkel.	Ana Neri.	Wanda de Aguiar Horta.	Florence Nightingale.	D
3	Enfermagem	Superior	São critérios utilizados para diagnóstico de infecção primária de corrente sanguínea:	aparecimento do primeiro sinal, sintoma ou resultados de exames utilizados para a definição da infecção, ocorrendo dentro do período de 5 dias.	a presença de acesso venoso central ou periférico no paciente.	febre ou hipotermia em maiores de 28 dias e menores de 1 ano de idade.	fios de marcapasso e cateter de curta permanência (inferior a 3 dias).	C
4	Enfermagem	Superior	Durante o exame físico de um adulto, foi identificada dor à compressão e descompressão súbita do ponto de McBurney, sugerindo que o paciente possui apendicite. O nome do sinal ou manobra utilizada é	Manobra de Ortolani.	Sinal de Murphy.	Sinal de Blumberg.	Sinal de Giordano.	C
5	Enfermagem	Superior	Ao realizar a punção de um acesso venoso periférico, as camadas da parede venosa a serem perfuradas são, respectivamente:	tecido liso, conjuntivo e enrugado.	túnica íntima, média e adventícia.	camada interna e externa.	túnica adventícia, média e íntima.	D
6	Enfermagem	Superior	O sinal de Babinski	indica lesão neurológica em qualquer faixa etária.	indica lesão neurológica em adultos, e não em neonatos.	indica lesão neurológica apenas em neonatos.	é normal quando presente em qualquer faixa etária.	B

7	Enfermagem	Superior	São exemplos de artigos semi-críticos:	cabo de bisturi e borracha para aspiração de secreção.	estetoscópio e comadre.	termômetro e cabo de laringoscópio.	inaladores e nebulizadores.	D
8	Enfermagem	Superior	Dorothea Orem descreveu a teoria	das Necessidades Humanas Básicas.	do Autocuidado.	da Relação Interpessoal.	Transcultural.	B
9	Enfermagem	Superior	São etapas do processo de enfermagem, descritos por Wanda de Aguiar Horta:	Histórico de enfermagem; Diagnóstico de enfermagem; Plano assistencial; Plano de cuidados; Evolução de enfermagem e Prognóstico de Enfermagem.	Histórico de enfermagem; Diagnóstico de enfermagem e Evolução de enfermagem.	Diagnóstico de enfermagem; Plano assistencial e Prognóstico de Enfermagem.	Histórico de enfermagem; Diagnóstico de enfermagem e Plano de cuidados.	A
10	Enfermagem	Superior	Os pacientes podem ser classificados de acordo com o grau de dependência da seguinte forma:	cuidado de intensidade baixa, média e alta.	cuidados mínimos, intermediários, semi-intensivos e intensivos.	cuidados mínimos e máximos.	dependente de enfermagem e não dependente de enfermagem.	B
11	Enfermagem	Superior	Durante a verificação da saturação de oxigênio sanguíneo de um recém-nascido em uma UTI neonatal, foi percebido que os valores obtidos no membro superior eram mais elevados que os obtidos no membro inferior. Essa alteração caracteriza	erro inato do metabolismo.	erro de medida relacionado ao aparelho.	malformação pulmonar.	cardiopatias congênitas.	D
12	Enfermagem	Superior	200 ml de soro fisiológico 0,9% é equivalente a	4.000 gotas.	10.000 gotas.	1.000 gotas.	6.000 gotas.	A
13	Enfermagem	Superior	Foi prescrito 250 mg de Vancomicina para um paciente. Considerando que a reconstituição deste medicamento é realizado em 10 ml de soro fisiológico 0,9% e que o frasco possui 500 mg de medicamento, escolha a alternativa que apresenta quantos mls devem ser aspirados do frasco, correspondendo à dose a ser administrada conforme prescrição médica.	5 ml.	0,25 ml.	25 ml.	0,5 ml.	A
14	Enfermagem	Superior	São condições que aumentam o risco cirúrgico, EXCETO:	hipertensão arterial controlada.	obesidade.	idade acima de 60 anos.	infarto do miocárdio a mais de 6 meses.	C

15	Enfermagem	Superior	São etapas da anestesia geral:	largada, aceleração e descontinuação.	baixo, médio e alto.	indução, manutenção e emergência.	início, meio e final.	C
16	Enfermagem	Superior	Escolha a alternativa que aponta corretamente o tipo de ostomia e o local onde está localizada.	Urostomia: uretra.	Gastrostomia: esôfago.	Colostomia: final do intestino grosso (reto).	Ileostomia: final do intestino delgado.	D
17	Enfermagem	Superior	A varicela é uma infecção transmitida por	contato com a pele íntegra.	saliva ou urina.	contato direto com as lesões abertas ou cicatrizadas.	contato direto com o líquido das vesículas.	D
18	Enfermagem	Superior	É um cuidado de enfermagem aplicado corretamente durante a realização de fototerapia por recém-nascidos:	deixar exposto à luz somente o abdome, o tórax e os membros.	realizar o controle de temperatura a cada 3 horas.	não retirar a proteção ocular ao alimentar o neonato submetido ao tratamento.	oferecer 10 ml de água nos intervalos da amamentação, a fim de reduzir o risco de desidratação.	B
19	Enfermagem	Superior	É uma complicação comum identificada no recém-nascido quando a mãe adquire rubéola durante a gestação:	cegueira.	má formação de membros.	mal desenvolvimento pulmonar.	plaquetopenia.	A
20	Enfermagem	Superior	A dequitação da placenta ocorre no	primeiro premonitório.	segundo período clínico do parto.	período de Greenberg.	terceiro período clínico do parto.	D
21	Enfermagem	Superior	É uma conduta adequada à gestante com prolapso de cordão umbilical:	induzir o trabalho de parto normal o mais breve possível.	manter a gestante em posição litotômica.	realizar toque vaginal e empurrar a apresentação fetal, aliviando a pressão no cordão umbilical.	tracionar o cordão umbilical para fora do canal vaginal.	C
22	Enfermagem	Superior	Sobre a eclâmpsia, é correto afirmar que	seu diagnóstico diferencial com a pré-eclâmpsia é o não surgimento de convulsões.	o diagnóstico é feito durante o trabalho de parto.	um dos métodos para redução da pressão arterial é a administração de sulfato de magnésio via endovenosa.	a síndrome HELLP, complicação da eclâmpsia, ocorre com o aparecimento de espuma na urina.	C
23	Enfermagem	Superior	Escolha a alternativa que aponta uma atividade que é exercida por todos os profissionais pertencentes à equipe de saúde da família.	Visita domiciliar.	Prescrição medicamentosa.	Sistematização da Assistência de Enfermagem.	Cadastramento das famílias a serem assistidas.	A

24	Enfermagem	Superior	É uma orientação adequada ao paciente em tratamento ambulatorial para tuberculose:	os medicamentos devem ser ingeridos, preferencialmente, durante as refeições.	não se preocupar com os efeitos colaterais dos medicamentos, pois só aparecem em pacientes desnutridos, HIV positivo e alcoólatras.	o paciente que faz uso de Rifampicina, tratamento comum da tuberculose, não apresentará efeitos colaterais.	as lactantes podem manter a amamentação durante o tratamento, mas devem utilizar máscaras para evitar a contaminação da criança.	D
25	Enfermagem	Superior	É um efeito colateral comum após a aplicação da vacina contra rotavírus:	encefalite.	irritabilidade.	crises convulsivas.	dermatite.	B